

مهم ترین علت ابتلای کودک به سندرم داون کدام است؟

1) الکلسم مادر

2) سن بالای مادر ☒

3) سوءتغذیه مادر

4) بیماری عفونی مادر

سندرم داون با کدام یک از بیماری های زیر ارتباط بالایی دارد؟

1) پارکینسون

2) آلزایمر ☒

3) کره هانتینگتون

4) مالتیپل اسکلروزیس

احساس خلا و پوچی، افکار پارانوئیدی گذرا و عدم کنترل خشم ویژگی کدام اختلال شخصیت است؟

1) نمایشی

2) مرزی ☒

3) اسکیزوتایپی

4) ضد اجتماعی

تکانش گری و دوره های افسردگی در بیماران مبتلا به اختلال مرزی با نابهنجاری کدام انتقال دهنده رابطه دارد؟

1) سروتونین ☒

2) دوپامین

3) گلوتامات

4) نوراپی نفرین

اختلال شخصیت مرزی با کدام اختلال شخصیت بیشترین همپوشی را دارد؟

1) نمایشی

2) وابسته

3) ضد اجتماعی ☒

4) پارانوئید

داروهای ضد تشنج در درمان کدام اختلال شخصیت به کار می روند؟

1) ضد اجتماعی

2) اسکیزوتایپی

3) مرزی ☒

4) وسواسی

برای تشخیص اختلال بولیمیا، رفتارهای پرخوری و تصفیه حداقل چند بار باید رخ دهند؟

1) یک بار در هفته به مدت سه ماه ☒

2) سه بار در هفته به مدت شش ماه

3) یک بار در هفته به مدت شش ماه

4) دو بار در هفته به مدت سه ماه

رایج ترین اختلال همزمان با بولیمیا کدام است؟

1) وسواس

2) افسردگی اساسی ☒

3) مصرف مواد

4) اختلال شخصیت مرزی

کدام اختلال شخصیت شیوع بالایی در اختلالات خورد و خوراک دارد؟

1) هیستری

2) مرزی ☒

3) ضد اجتماعی

4) وابسته

وجه تمایز آنورکسیای غیر معمول از اختلال آنورکسیا چیست؟

1) عدم رفتارهای جبرانی

2) حفظ وزن نرمال ☒

3) دوره های پرخوری متعدد

4) قطع عادت ماهیانه

کدامیک جزو طبقه اختلالات خورد و خرواک در DSM-5 نیست؟

1) پیکا

2) آنورکسیا نوروزا

3) خورد و خوراک کودکان ☒

4) نشخوارگری

اختلال پیکا با کدام ویژگی مشخص می شود؟

1) برگرداندن غذا به دهان و جویدن دوباره آن

2) خوردن مواد غیر غذایی ☒

3) خوردن مواد غذایی انتخابی و محدود

4) اجتناب از غذا خوردن

کدام اختلال در دختران شایع تر از پسران است

1) اختلالات دفعی

2) اختلال یادگیری خاص

3) اختلالات تیک

4) اختلالات افسردگی ☒

کدامیک درباره کودک مبتلا به نوشتار پریشی فضایی غلط است؟

1) سرعت ضرب گیری با انگشتان عادی است

2) هجی کردن شفاهی کودک عادی است

3) نقاشی کودک بسیار بد است

4) می تواند متن را نسبتا خوب کپی کند ☒ .

در کدام نوع دیسگرافیا هجی کردن شفاهی کودک دچار مشکل است؟

1) فضایی

2) حرکتی

3) دیسلکسیک ☒

4) مضاعف

ADHD با کدام یک از اختلالات زیر بالاترین میزان همپوشی را دارد؟

1) افسردگی

2) ☒ سلوک

3) ارتباطی

4) یادگیری

کدام یک درباره نشانه های تشخیصی اختلال ADHD در DSM-5 صحیح نیست؟

1) حداقل به مدت 6 ماه حضور داشته باشند.

2) از 12 سالگی شروع شده باشند ☒ .

3) حداقل در 2 موقعیت مشاهده شوند.

4) هیچ کدام

در کدامیک از اختلالات زیر تولید مرحله ای اصوات و کلمات دچار مشکل است؟

1) اختلال آواهای گفتاری

2) ☒ اختلال سیالی کلامی

3) اختلال زبان

4) اختلال یادگیری خاص از نوع خوانش پریشی

مدار حرکتی BGT در کدامیک از اختلالات زیر نابهنجاری است؟

1) اختلال آواهای گفتاری

2) اختلال سیالی کلامی ☒

3) اختلال زبان

4) اختلال یادگیری خاص از نوع خوانش پریشی

روش (فیدبک شنیداری تغییر یافته) برای درمان کدام اختلال استفاده می شود؟

1) اختلا آواهای گفتاری

2) اختلال سیالی کلامی ☒

3) اختلال زبان

4) اختلال یادگیری خاص از نوع خوانش پریشی

طبقه بندی های جدید به کدام ملاک برای طبقه بندی معلولیت ذهنی تاکید می کنند؟

1) شدت نقص ذهنی و رشدی

2) نوع حمایت مورد نیاز ☒

3) میزان آموزش پذیری

4) علت ناتوانی ذهنی

نالتراکسون در درمان کدامیک از اختلالات زیر به کار نرفته است؟

1) اختلال طیف اتیسم

2) اختلال هماهنگی حرکتی رشدی

(3) اختلال هویت گسسته ☒

(4) اختلال حرکت کلیشه ای

متمرکز کردن درمان روی رفع نقص های توجهی مثالی از کدام نوع درمان است؟

(1) درمان ادغام حسی

(2) درمان مبتنی بر فرایند ☒

(3) زنجیره سازی

(4) درمان شناختی رفتاری

کدام اختلال در کودکانی که در محیطه های محدود کننده زندگی می کنند شایع تر است؟

(1) اختلال طیف اتیسم

(2) اختلال حرکات کلیشه ای ☒

(3) اختلال هماهنگی حرکتی رشدی

(4) اختلالات تیک

کدام گزینه به درستی ملاک تشخیصی اختلال تورت را بیان می کند؟

(1) یک یا چند حرکتی و یک چند تیک صوتی ☒

(2) یک یا چند تیک حرکتی یا یک یا چند تیک صوتی

3) یک یا چند تیک حرکتی و یا تیک صوتی
4) یک یا چند تیک حرکتی بدون تیک صوتی