

سوالات استخدامی بهداشت عمومی

تالاسمی در کدام منطقه ایران شایع تر است؟

1) سواحل خلیج فارس ☒

2) مناطق شرق کشور

3) مناطق غربی کشور

4) آذربایجان

یکی از علایم مشهور بیماری و با که منجر به مرگ میشود کدام است؟

1) تب و لرز

2) اختلال در سیستم اعصاب

3) استفراغ شدید

4) اجابت مزاج مداوم ☒

در کشور هند در سال از هر 1000 نفر 9 نفر میمیرند میزانی که از همه بهتر این حالت را توصیف کند

کدام است؟

1) میزان بیماری زایی

2) میرایی تطبیق شده سنی

3) میزان حمله ثانوی

4) میرایی خام ☒

غنی ترین منبع ویتامین E کدام روغن زیر است؟

1) ذرت

2) زیتون

3) نارگیل

4) ☒ سویا

کروم در متابولیسم کدام ماده مغذی زیر نقش دارد؟

1) کازئین

2) اسید آراشیدونیک

3) ☒ گلوکز

4) فیبر غذایی

آمیب ها در کدام یک از دسته بندیهای میکروارگانیسم ها می باشند؟

1) باکتری ها

2) ☒ پروتوزوئرها

3) کپک ها

4) کرم های انگلی

کدام مورد در ایجاد کاندیدیازیس واژن مؤثرتر است؟

1) بیماری قند

2) خوردن مواد غذایی آلوده

3) رعایت نکردن بهداشت فردی

4) مقاربت با اشخاص آلوده ☒

آنتروتوکسین باکتریها در کجا ترشح می شود؟

1) در داخل روده

2) در داخل سلول

3) در داخل معده

4) در محیط کشت میکروبی ☒

از نقطه نظر، پزشکی مهمترین فلوک انسانی که در کشور نیز یافت می شود، کدام است؟

1) خونی

2) روده ای ☒

3) ریوی

4) کبدی

میکروب های گرم منفی در روش رنگ آمیزی، گرم رنگ کدام ماده را به خود می گیرند؟

1) فوشین ☒

2) کریستال ویوله

3) لوکل

4) ید

کدام یک از باکتریهای زیر دارای هاگ (اسپور) میباشد؟

1) بورده تلا پرتوسیسی

2) سالمونلا تیفی

3) کورینه باکتریوم دیفتريا

4) ☒ کلوستریدیوم تتانی

به کار بردن کدام قطره در پیشگیری از عفونتهای گنوره و کلامیدیا در چشم نوزاد صحیح تر است؟

1) آنتی بیوتیک

2) سولفاستامید

3) کلرید سدیم

4) ☒ نیتترات نقره

کمیبود کدام عنصر منجر به وقفه در رشد کودک میشود؟

1) ☒ آهن

2) پتاسیم

3) روی

4) کلسیم

میزبان کرم کدري *Diphyllbothrium latum* کدام جانور است؟

1) خوک

2) گاو

3) گوسفند

4) ماهی ☒

توسل به استانداردها راهی است:

1) آسان برای تعیین میزان بهره وری در بیمارستان

2) منحصر بفرد برای ارزیابی مراقبتهای بهداشتی و درمانی ☒

3) دشوار برای رسیدن به اهداف سازمان

4) گزینه های (1) و (3)

جنس سم خارجی باکتریها چیست؟

1) پروتئین

2) پلی ساکارید

3) لیپوپروتئین ☒

4) لیپو پلی ساکارید

کدام یک از الکترولیت‌های زیر بیشتر در داخل سلول هستند؟

1) پتاسیم ☒

2) سدیم

3) کلسیم

4) منیزیم

ید در ساختمان شیمیایی کدام هورمون شرکت دارد؟

1) آدرنالین

2) انسولین

3) تیروکسین ☒

4) رشد

مطالعه روی مهاجرین در روشن کردن نقش در بروز بیماری‌هاست

1) آداب و رسوم و تفاوت‌های اجتماعی و اقتصادی

2) تمایز اثرات نژادی و قومی از عوامل زیست محیطی ☒

3) توارث و نژاد و قومیت

4) عوامل زیست محیطی

مهم ترین عامل افزایش جمعیت در یک جامعه کدام است؟

1) تولد خام ☒

2) مرگ خام

3) مهاجرت به داخل

4) مهاجرت به خارج

وقتی یک آزمایش غربالگری دارای اعتبار (Validity) کمی است کدام مورد را بیشتر دارد؟

1) اختصاصی بودن

2) خطا

3) قابلیت تکرار پذیری

4) منفی و مثبت کاذب ☒

اسیتی مرکوس، بویس مرحله لاروی کدام انگل است؟

1) فاسیولا هیاتیکا

2) تنیا سولیوم

3) تنیا ساریناتا

4) کینوکوکوس گرانولوزوس ☒

پیشگیری ثالث در بیماران روانی عبارت است از:

1) جلوگیری از پیدایش عوارض بیماری

2) جلوگیری از پیدایش بیماری

3) بیماریابی، تشخیص زودرس و درمان صحیح

4) جلوگیری از پیشرفت و طولانی شدن بیماری ☒

چنانچه اندازه سفتی پوست در تست مانتو بین 4-5 میلیمتر باشد:

1) تست سل مثبت است.

2) تست سل منفی است ☒.

3) فرد باید تحت مراقبت ویژه قرار گیرد.

4) فرد باید قرنطینه شود.

برای تشخیص کدام یک از آلودگیهای انگلی زیر کشت مدفوع کاربرد دارد؟

1) تریکو سفال

2) استرونژیلوئیدس ☒

3) انتروبیوس

4) دراکونکولوس

غلاف پروتئینی ویروس فاز را چه مینامند؟

1) کپسید ☒

2) کپسومر

3) کپسول

4) دیواره سلول

کدام یک از قارچهای زیر عامل برفک نوزادان است؟

1) آسپرژیلوس

2) پنی سیلیوم

3) درماتوفیتها

4) کاندیدا آلبیکنس ☒

AFFinity چیست؟

1) قدرت تحریک سیستم ایمنی بدن

2) ظرفیت ترکیبی آنتی ژن و آنتی کور

3) میل ترکیبی آنتی ژن و آنتی کور ☒

4) واکنش های وابسته به سلول

کدام دسته از میکروارگانیسمهای زیر جزء قارچ ها هستند؟

1) کاندیداها ☒

2) کلستریدیوم ها

3) لیستریاها

4) هموفیلوس ها

کدام دسته از باکتریهای زیر جزء باکتریهای میله ای اسید فست میباشند؟

1) فوز و باکتریوم ها

2) کرینه باکتریوم ها

3) کلستریدیوم ها

4) مایکوباکتریوم ها ☒

تخم کدام یک از انگل های کرمی زیر پس از دفع شدن از طریق مدفوع بلافاصله نمی تواند انسان را آلوده کند و لازم است که مدت چند هفته در خاک مناسب باقی بماند و آنگاه آلوده کننده شود؟

1) آنتریبیوس ورمیکولاریس

2) آسکاریس یک تا دو هفته تریکوریس تریکورا (3 تا 5 هفته ☒)

3) شیزتوزوما

4) هیمنولپیس نانا

اقدام مناسب پرستاری در بیمار مبتلا به اسهال کدام است؟

1) تشویق به نوشیدن مایعات حاوی الکترولیت ☒