

سوالات اعتیاد و مواد مخدر

1) کدام گزینه جز عناصر اصلی مدل کرافت نیست؟

الف) پیشگیری از مصرف مواد

ب) آموزش روابط بین فردی

ج) تاکید بر پیشگیری از خشونت

د) استراتژی انگیزشی

2) کدام گزینه جز ویژگی های افراد مهم در مدل کرافت نیست؟

الف) مشتاق باشند

ب) تماس و زمان کافی با بیمار داشته باشند

ج) بالای 18 سال سن داشته باشند

د) تجربه مصرف مواد در گذشته خود داشته باشند

3) برای بیمار دچار اعتیاد تزریقی به هروئین به مدت ده سال و سابقه زندانهای متعدد کدام دارو گزینه اول درمانی است؟

الف) متادون

ب) بوپرنورفین

ج) تننور تریاک

د) ویویتال

4) بیماری در فاز نگهدارنده درمان با متادون به میزان 120 میلی گرم در روز به مدت دو روز از درمان غیبت داشته است کدام گزینه را برای ادامه درمان وی پیشنهاد می کنید؟

الف) ادامه درمان با 120 میلی گرم

سوالات اعتیاد و مواد مخدر

(ب) ادامه درمان با 80 میلی گرم

(ج) ادامه درمان با 100 میلی گرم

(د) القای مجدد با 40 میلی گرم

5) آقای 35 ساله 4 هفته پس از قطع مصرف آمفتامین اعتقاد پیدا کرده که وزارت اطلاعات در منزل وی شنود گذاشته است کدام گزینه به ضرر تشخیص اختلال سایکوز ناشی از آمفتامین است؟

الف) وجود هذیان گزند و آسیب

(ب) فاصله چهار هفته ای با پیدایش علایم

(ج) جنسیت مذکر

(د) سن بیمار

6) نیمه عمر داروی متادون حدودا چند ساعت است؟

الف) 24 ساعت

(ب) 12 ساعت

(ج) 36 ساعت

(د) 48 ساعت

7) وجود کدام گزینه زیر در شرح حال به نفع اختلال افسردگی دو قطبی (در مقابل افسردگی تک قطبی) می باشد؟

الف) سن شروع علایم بالاتر

(ب) افسردگی پس از زایمان

(ج) نبود اختلال افسردگی در خانواده

سوالات اعتیاد و مواد مخدر

(د) نبود علائم سایکوتیک در اپیزودهای خلقی

8) برای بیماری که تحت درمان نگهدارنده با متادون بوده به عنوان ضدافسردگی کدام داروی زیر از اولویت کمتری برخوردار است؟

الف) فلوکستین

ب) سرترالین

ج) سیتالوپرام

د) فلووکسامین

9) معمولاً مصرف نالتراکسون در افراد عادی (مصرف کننده مواد اپیوئیدی نباشند)

الف) می تواند سبب ایجاد سندرم محرومیت شود.

ب) می تواند سبب وابستگی دارویی شود.

ج) علائمی تولید نمی کند.

د) می تواند سبب بیش مصرفی مواد اپیوئیدی شود.

10) در آزمون چالش نالتراکسون کدام پاسخ درست است؟

الف) حداقل زمان در حالت تزریق زیر جلدی 30 دقیقه است

ب) حداقل زمان در حالت خوراکی 2 تا 3 ساعت است

ج) هر گاه تست منفی باشد می توان کپسول خوراکی را شروع کرد

د) همه موارد صحیح است

11) کدام عارضه جانبی نالتراکسون خیلی شایع نیست؟

سوالات اعتیاد و مواد مخدر

الف) درد شکم

ب) تشنگی

ج) اضطراب

د) سردرد

12) مصاحبه انگیزشی چیست؟

الف) یک شیوه درمان اختلال مصرف مواد

ب) یک روش برقراری ارتباط هدفمند

ج) یک روش مشاوره غیرمستقیم

د) همه موارد

13) عناصر مصاحبه انگیزشی کدامند؟

الف) عامدانه بودن

ب) هدفمند بودن

ج) فردمحور بودن

د) همه موارد

14) استراتژی های مصاحبه انگیزشی کدامند؟

الف) دور زدن مقاومت

ب) سوالات باز پاسخ

ج) حمایت از خودکارآمدی

سوالات اعتیاد و مواد مخدر

(د) همه موارد

15) کدام یک از عفونتهای پوستی زیر در مصرف کنندگان تزریقی مواد نسبت به افراد مشابه که تزریق نمی کنند بیشتر دیده می شود؟

الف) آبسه های پوستی

ب) پیومیوزیت

ج) بوتولیسم زخم

(د) همه موارد

16) وجود تب همراه با درد کمر در یک مصرف کننده مواد مطرح کننده کدام یک از موارد زیر است؟

الف) استئومیلیت ورتبرال

ب) اندوکاردیت

ج) هر دو

(د) هیچ کدام

17) کدام یک از داروهای زیر با مصرف افلویرنز سطح سرمی اش کاهش می یابد؟

الف) متادون

ب) بوپرنورفین

ج) نالتروکسان

(د) هر سه

سوالات اعتیاد و مواد مخدر

18) وسوسه را تعریف کنید؟

الف) میل با فشار زیاد

ب) به تفکرات شخص مصرف کننده نفوذ می کند

ج) بر روی خلق مصرف کننده اثر می گذارد

د) همه موارد

19) وسوسه به چند طریق تجربه می شود؟

الف) جسمی

ب) شناختی

ج) عاطفی

د) همه موارد

20) لغزش را تعریف کنید؟

الف) شروع مجدد اعتیاد بعد از یک دوره پرهیز

ب) لغزش یکباره و بی دلیل اتفاق نمی افتد

ج) به افکار و ذهن اجازه داده می شود به حالت قبلی خود یعنی دوران اعتیاد بازگردد

د) همه موارد

21) دلایل لغزش چیست؟

الف) طبیعت و عادت

ب) بیماری مزمن

سوالات اعتیاد و مواد مخدر

ج) افکار ناسالم

د) همه موارد

22) جهت تعیین جایگاه ارائه خدمات درمانی در اعتیاد کودک و نوجوان توجه به تمامی ابعاد زیر با اهمیت بالا توصیه شده است جز؟

الف) عود، تداوم مصرف یا پتانسیل مشکل

ب) اشتغال

ج) مسمومیت و محرومیت

د) آمادگی تغییر

23) کدامیک از مداخلات روانی اجتماعی زیر در ابتدای تشخیص و فرآیند درمان اعتیاد کودک و نوجوان مد نظر قرار نمی گیرد؟

الف) رویکرد تحلیلی

ب) رویکرد خانواده درمانی

ج) مصاحبه انگیزشی

د) درمان شناختی رفتاری

24) کدامیک از موارد زیر جزو ملاک های نشان دهنده خطر بالا جهت آغاز درمان نگهدارنده با بوپرنورفین یا متادون در اعتیاد نوجوانان محسوب نمی شود؟

الف) مصرف تزریقی مواد

ب) افت تحصیلی نوجوان

ج) سابقه بیش مصرفی

د) ابتلا به هیپاتیت سی

سوالات اعتیاد و مواد مخدر

25) در مصرف تمامی مواد زیر شیردهی در مادران مجاز نبوده و توصیه نمی شود به جز؟

الف) هروئین

ب) مت آمفتامین

ج) بوپرنورفین

د) کدئین

26) تمام موارد از اصول ارزیابی در درمان اختلالات مصرف مواد است به جز:

الف) رعایت رازداری

ب) رعایت حریم خصوصی

ج) پرهیز از پرسیدن سوالات حساس مثل تزریق یا تمایل به خودکشی برای احترام به فرد

د) نشان دادن همدلی

27) تجربه علائم محرومیت متعاقب قطع مصرف مواد افیونی نشان دهنده نیاز به کدام یک از حوزه های نیاز در هرم مازلو است؟

الف) خودشکوفایی

ب) عشق و تعلق

ج) ایمنی و امنیت

د) زیستی و فیزیولوژیک

28) گشادی مردمک در تمام موارد زیر دیده می شود به جز:

الف) مسمومیت حشیش

سوالات اعتیاد و مواد مخدر

(ب) محرومیت مواد افیونی

(ج) مراحل پیشرفته و طول کشیده مسمومیت مواد افیونی

(د) مسمومیت مت آمفتامین

29) سریعترین روش رسیدن مواد به مغز کدام است؟

الف) مشامی

ب) کشیدنی

ج) تزریق عضلانی

د) تزریقی وریدی

30) تجربه علائم محرومیت متعاقب قطع مصرف مواد افیونی نشان دهنده نیاز به کدام یک از حوزه های نیاز در هرم مازلو است؟

الف) خودشکوفایی

ب) عشق و تعلق

ج) ایمنی و امنیت

د) زیستی و فیزیولوژیک

31) بی خانمانی در فرد مبتلا به اختلال مصرف مواد افیونی نشان دهنده نیاز به کدام یک از حوزه های نیاز در هرم مازلو است؟

الف) زیستی و فیزیولوژیک

ب) ایمنی و امنیت

ج) اعتماد به نفس

د) عشق و تعلق

سوالات اعتیاد و مواد مخدر

32) دی سولفیرام با چه ساز و کاری در درمان پیشگیری از عود الکل اثر می کند؟

الف) ایجاد انزجار

ب) مسدود کردن اثرات تقویت کننده مثبت الکل

ج) جایگزینی آگونیستی

د) درمان اختلالات روان پزشکی همبود

33) وارانیکلین در درمان اختلال مصرف کدام یک از گروه های مواد زیر مؤثر است؟

الف) تنباکو

ب) گل و حشیش

ج) الکل

د) مواد افیونی

34) در پروتکل درمان با کمک اپیوم تینچر استفاده از کدام یک از الگوهای درمان نیز مورد تایید قرار گرفته است؟

الف) محرومیت مدیریت شده در عرض 2 هفته

ب) نگهدارنده

ج) کاهش تدریجی همراه با شرکت در جلسات گروه های کمک متقابل

د) ب و ج

35) استفاده از درمان نگهدارنده با اپیوم تینچر برای کدام یک از گروه های زیر توصیه می شود؟

الف) کسانی که سابقه درمان با روشهای دیگر نداشته اند

سوالات اعتیاد و مواد مخدر

ب) بیمارانی که از درمان با متادون و بوپرنورفین پاسخ نگرفته اند و متعاقب سم زدایی اقامتی به جای بهبودی به سوی تشدید علایم و افت روانی اجتماعی حرکت می کنند

ج) افرادی که سابقه اختلال مصرف ترامادول دارند

د) کسانی که مصرف مواد افیونی را دارند اما ملاکهای اختلال مصرف مواد افیونی را پر نمی کنند

36) تمام موارد زیر از مشکلات درمان با بوپرنورفین در زندان است به جز:

الف) هزینه بیشتر دارو

ب) عوارض جانبی بیشتر نسبت به متادون

ج) زمان بیشتر برای تجویز تحت نظارت دارو

د) تمام موارد