

بخشی از سوالات استخدامی پرستاری سال 1404

1-نمره ابکاری و توصیه لازم برای نوزاد نارسى که دارای علائم تونوسيته عضلانی ضعيف، گريه ضعيف و کبودی اندام ها درهنگام گريه و ضربان قلب 110 است چه می باشد؟

الف) 6 و اکسيژن درمانی

ب) 5 و تهويه کمکی با لوله گزاری نای

ج) 7 و بدون نیاز به احیاء

د) 3 و نیاز به عملیات احیاء

2-کدام گزینه از خصوصیات اریتماتوکسیکوز نوزاد است؟

الف) انتشار در کل سطح پوست

ب) در روز 5 تا 7 تولد بروز می کند.

ج) تحریک با محلفه و لباس عامل بروز است.

د) وزیکولهای که ترشحات چرکی دارد.

3- مادری میگوید نوزاد 4 ماهه دارد و شیر او کافی نیست ، با توجه به اینکه نوزاد او در بدو تولد 2500 گرم وزن داشته کدام گزینه گفته مادر را تایید می کند؟

الف) نوزاد بیش از حد گریه می کند

ب) در 24 ساعت 4 بار دفع ادرار دارد.

ج) تا 4 ماهگی 2400 گرم وزن اضافه کرده است.

(د) در 24 ساعت دوبار دفع مدفوع دارد

4- کدام یک از موارد زیر باید در تغذیه تکمیلی نوزاد زیر یکسال رعایت شود؟

الف) استفاده از قطره آهن همراه با ابمیوه برای افزایش جذب

ب) استفاده از نمک ید دار

ج) گوشت در قطعه های کوچک طبخ شود.

د) استفاده از اسفناج در غذا

5- کدام گزینه می تواند عامل تغییر در برنامه واکسیناسیون باشد؟

الف) تزریق خون به صورت مکرر

ب) داشتن وزن پایینتر از 2 کیلوگرم

ج) نوزادی که تالاسمی دارد

د) نوزادی که زردی دارد

نمونه سوالات پرستاری با جواب

6- کمبود روی در کودکان کدام علائم را دارد؟

الف) بلوغ زودرس و قد کوتاه

ب) تاخیر در بلوغ و تاخیر در رشد

ج) انمی هیپو کروم و تاخیر در بلوغ

د) نوتروپنی و بلوغ زودرس

7- در صورت ابتلا یکی از اعضای خانواده به هپاتیت ب ، با واکسینه شدن تمام اعضای خانواده کدام یک از موارد زیر باید رعایت شود؟

الف) با HBsAb کمتر از ۱۰ ، تزریق سه نوبت واکسن با مقدار دو برابر

ب) کنترل HBsAg نه تا پانزده ماه بعد

ج) با HBsAB کمتر از ۱۰ تزریق مجدد یک نوبت واکسن با مقدار معمول

د) کنترل HBsAg سه ماه بعد

8- کدامیک از موارد زیر در غربالگری هیپوتیروئیدی نوزادان اهمیت دارد؟

الف) تحویز قرص های لووتیروکسین یا شیر خشک هایی مانند ایزومیل.

ب) کنترل نوزاد در سن 4 هفتگی با $TSH=5/4$

ج) کنترل نوزاد در سه هفتگی با $TSH=20$

د) عدم مصرف قرصهای لووتیروکسین با قطره آهن

9- برای هدف بارداری های سوم به بعد چند درصد دسترسی به حفاظت زوجین اهمیت دارد ؟

الف) 20 درصد

ب) 30 درصد

ج) 40 درصد

د) 60 درصد

10- اگر در یک جمعیت 3 میلیون نفری 20 هزار زن باردار وجود داشته باشد و در میان این زنان 4 درصد پراکلامپسی مشاهده شده باشد، چند درصد شیوع این بیماری در جمعیت وجود دارد؟

الف) 13 در هزار

ب) 20 در هزار

ج) 13 در صدم هزار

د) 2 دهم در هزار

11- خانواده ای که یک فرزند دارد و خانم با 32 سال سن و بیماری قلبی انسداد کرونری است کاندید چه روشی پیشگیری از بارداری می باشند؟

الف) قرصهای ترکیبی

ب) حلقه های واژینال

ج) وازکتومی

د) آمپولهای پروژسترونی

12- برای خانم 26 ساله با دو فرزند که دچار بیماری تشنج است چه روشی برای پیشگیری از بارداری مناسب است؟

الف) آمپول سیکلرفم

ب) قرص لاینسترونول

ج) قرص تری فازیک

د) آمپول دیپروورا

13- برای خانم 22 ساله که با شروع قرصهای ترکیبی دچار لکه بینی شده است چه روشی مناسب است؟

الف) نیازی به درمان نیست

ب) 7 روز استروژن استفاده نماید

ج) ده روز پروژسترون استفاده نماید

د) تعداد قرصها را دو برابر کند.

14- در رابطه با آمپول های دیپروورا کدام گزینه صحیح است؟

الف) تحت تاثیر وزن فرد است

ب) تحت تاثیر داروهای محرک آنزیمهای کبدی است

ج) اثر آن معادل روشهای جراحی است

د) اثر آن معادل آیودی است

15- در کدام یک از روشهای پیشگیری از بارداری ضرورت دارد که رفتارهای پر خطر جنسی بررسی شود؟

الف) نورپلانت

ب) حلقه واژینال

ج) ایودی

د) قرصهای ترکیبی

16- برای چکاب کودک 12 ماهه کدام مورد باید بررسی شود؟

الف) عدم توانایی در راه رفتن

ب) درنیامدن دندان

ج) عدم توانایی در بیان عبارات دو کلمه ای

د) عدم شناخت اعضای بدن

17- کدام اقدام در رابطه با تغذیه کودک 8 ماهه که اسهال پایدار دارد مورد نیاز است؟

الف) استفاده از غذاهای هیپر اسمولار

ب) دریافت انرژی ۱۱۰ کیلو کالری به ازاء وزن بدن در دو روز

ج) پیگیری وضعیت کودک بعد از سی روز از ابتلاء

د) اضافه کردن یک وعده غذای اضافی تا دو هفته

نمونه سوالات داخلی جراحی پرستاری رایگان با جواب

18- در رابطه با آقای 38 ساله که با داشتن سه فرزند میخواهد اقدام به وازکتومی نماید و سابقه فتق کشاله ران

و حساسیت به لیدوکائین دارد چه اقدامی مناسب است؟

الف) تا سه ماه به تاخیر انداخته شود

ب) به بیمارستان ارجاع شود

ج) با احتیاط عمل NSV انجام شود

د) روش پیشگیری دیگری را مدنظر قرار دهد

19- در خانم 45 ساله که دیابت وابسته به انسولین دارد و کراتینین 5/1 است چه روش پیشگیری از بارداری مناسب است؟

الف) نورپلنت

ب) قرص ال دی

ج) امپول پروژسترون

د) ایودی

20- کدام گزینه دومین سطح ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور ایران است؟

الف) مراکز بهداشتی - درمانی روستائی

ب) خانه های بهداشت روستای اصلی

ج) بیمارستانهای شهرستان

د) در خانه های بهداشتی روستای قمر

21- کدام دسته از کودکان در برابر کمبود ویتامین A آسیب پذیر نیستند؟

الف) نوزادانی که با وزن کمتر از 2/5 کیلو متولد شده اند.

ب) کودک زیر 6 ماه

ج) کودکانی که بیماری عفونی دارند

د) کودکانی که در مناطق خشک هستند

22- کدام گزینه در مشاوره با والدین در رابطه با رشد و تکامل کودک پیشنهاد می شود؟

الف (تشویق مادر به سوال کردن در صورت اضطراب مادر

ب (بیان گسترده توصیه ها

ج (کنترل میزان درک مادر از مطالب آموزشی

د) استفاده از کارت رشد برای آموزش

دانلود سوالات استخدامی پرستاری با پاسخ

23- در ارتباط با خانمی که 7 روز بعد از زایمان دچار درد و قرمزی پستان راست شده است و درجه حرارت 38 درجه دارد چه اقدامی باید انجام شود؟

الف) مصرف مسکن و انتی بیوتیک

ب) کم کردن دفعات شیر دهی

ج) سنوگرافی پستان

د) تجویز کمپرس سرد و پماد انتی بیوتیک

24 - کدام یک از موارد زیر در ارتباط با سطوح پیشگیری صحیح است؟

الف (تجویز اسید فولیک قبل از بارداری - مقدماتی

ب (تجویز آهن مکمل در طی بارداری - سه

ج) ورزش برای بیماران دیابتی - یک

د (خود ازمایی پستان - دو

25- در رابطه با نوزادی که در 14 روزگی بند ناف جدا نشده و در پایه آن ترشحات موکوییدی وجود دارد چه اقدامی لازم است؟

الف (شستشو با بتادین

ب (شستشو با الکل سفید

چ) پرهیز از حمام نمودن نوزاد

د) تجویز آنتی بیوتیک خوراکی

26- ایمنوگلوبولینهای محرک تیروئیدی از طریق اتصال به کدام هورمون تاثیر می گذارند؟

الف (تیر و تروبین

ب) تری یدوتیرونین

ج (تیروکسین

د) هورمون آزاد کننده تیروتروبین

27- در خانمی که علائمی از جمله تاکیکاردی ، افزایش تعداد نبض در زمان خواب ، عدم افزایش وزن علیرغم تغذیه طبیعی دارد کدام یک از موارد زیر پیش بینی می شود؟

الف (افزایش میزان تیروتروپین

ب) افزایش مقدار T4 آزاد سرم

ج (کاهش T3

د) کاهش TRH

28- در صورت عود مکرر باکتریوزی بدون علامت در حاملگی چه اقدامی ضروری است؟

الف) در صورت عود درمان سود

ب) بیمار تحت نظر پزشک باشد

ج) درمان در ادامه حاملگی انجام شود

د) نیاز به اقدام خاصی نیست.

29- برای خانم بارداری که آسم خفیف متناوب دارد چه درمانی پیشنهاد می شود؟

الف) تجویز اگونیستهای بتای استنشاقی

ب) عدم مداخله

ج) استفاده از کورتیکواستروئید استنشاقی

د) مصرف کوتیکواستروئیدهای خوراکی

30- موارد نادر در خانمهای بارداری که پروتز درچه مکانیکی قلب دارند کدام گزینه است؟

الف- مرگ و میر 3 تا 4 درصد

ب- ترومبولی آمبلو و خونریزی جای نگرانی دارد

ج- احتمال سقط است

د- داروی ضد انعقاد تiaz ندارند.