

سوالات کتبی نجات غریق

-ارزیابی روند تنفس و ضربان نبض، وجود شکستگی و خونریزی، علائم واضح شوک در این بخش از سلسه مراتب امداد رسانی انجام میشود؟

- (۱) ارزیابی مقدماتی
- (۲) ارزیابی اولیه ✓
- (۳) ارزیابی ثانویه
- (۴) مراقبت های تکمیلی

-جمع اوری و گندزدایی تجهیزات امداد و نجات جز کدام بخش از سطوح امداد رسانی می باشد؟

- (۱) ارزیابی ثانویه
- (۲) ارزیابی مقدماتی
- (۳) مراقبت های تکمیلی
- (۴) ملاحظات پایانی ✓

-برای ارزیابی روند نبض افراد مصدوم از انگشت استفاده میکنند

- (۱) شصت
- (۲) اشاره
- (۳) میانی
- (۴) اشاره و میانی ✓

-به شدتی از درد که تحمل آن برای فرد به راحتی و یا نسبتا راحت امکان پذیر نباشد....

- (۱) دردخفیف
- (۲) دردمتوسط ✓
- (۳) دردشدید
- (۴) دردمزمن

-برای ارزیابی میزان وسطح هوشیاری نوزاد کدام مورد صحیح نمی باشد؟

- (۱) باصدای بلندنوزاد را صدامیزنیم
- (۲) درمقابل صورت نوزاد دستان خودرا بهم میزنیم
- (۳) نوزاد رامحکم تکان می دهیم ✓
- (۴) باضربه انگشتان دست خود، کف پا و کف دست نوزادراتحریک مینماییم

-کدام یک از تکنیک های تنفس مصنوعی بیشتر برای نوزاد استفاده میشود؟

- (۱) دهان به بینی
- (۲) دهان به دهان
- (۳) دهان به دهان و بینی ✓
- (۴) دهان به مری

-تفاوت عمده تنفس کمکی در مقایسه با تنفس مصنوعی در چیست؟

- ۱) در تنفس کمکی، اعمال تنفس باندک فشار بیشتر انجام میشود ✓
- ۲) در تنفس مصنوعی، اعمال تنفس باندک فشار بیشتر انجام میشود
- ۳) در تنفس کمکی سرمصدوم باید ب سمت عقب باشد
- ۴) در تنفس مصنوعی سرمصدوم در وضعیت طبیعی قرار دارد

-تفاوت تنفس کمکی در مقایسه با تنفس مصنوعی در چیست؟

- ۱) در تنفس کمکی، سرمصدوم باید در وضعیت طبیعی بوده و اعمال تنفس باندک فشار بیشتر انجام شود ✓
- ۲) در تنفس کمکی، سرمصدوم باید متمایل ب عقب بوده و اعمال تنفس باندک فشار بیشتر انجام شود
- ۳) در تنفس مصنوعی، سرمصدوم باید متمایل ب عقب بوده و اعمال تنفس باندک فشار بیشتر انجام شود
- ۴) در تنفس مصنوعی، سرمصدوم باید در وضعیت طبیعی بوده و اعمال تنفس متناسب با سن و جثه فرد باشد

-در عملیات احیا کودک، وضعیت قرارگیری دست های منجی به هنگام ماساژ قلبی چگونه است؟

- ۱) بادو انگشت
- ۲) باپاشنه یک دست ✓
- ۳) باپاشنه دو دست
- ۴) باتمام کف دست

-کدامیک از علائم و نشانه های انسداد ناقص مجرای تنفس در فرد بهوش نمی باشد؟

- ۱) فرد شروع ب سرفه کردن می نماید
- ۲) رنگ چهره فرد ب سرخی متمایل میشود
- ۳) دهان فرد باز و برای گرفتن هوای دم تلاش و تقلا می کند ✓
- ۴) فرد نسبتا دستپاچه و مضطرب است

-منجی امدادگر چ زمانی میتواند عملیات احیا قلبی-تنفسی را متوقف کند؟

- ۱) هنگامی ک علائم واضح حیات پدیدار شود
- ۲) در شرایطی ک جان منجی/ امدادگر در وضعیت ناامن و یا خطرناک قرارگیرد
- ۳) هنگامی ک خدمه اورژانس وارد صحنه شوند
- ۴) همه موارد ✓

-در عملیات رفع انسداد کامل مجاری تنفسی، محل اعمال ضربه پشتی کجا می باشد؟

- ۱) کمر
- ۲) پشت گردن
- ۳) بین استخوان دو کتف ✓
- ۴) مورد ب و ج

-در خونریزی های شدید اولین و مهمترین اقدام کدام است؟

- (۱) قطع خونریزی ✓
- (۲) عملیات احیای قلبی تنفسی
- (۳) بررسی میزان و سطح هوشیاری
- (۴) تماس با اورژانس

-کدام مورد جزء کمک های اولیه در خونریزی های شدید نمی باشد؟

- (۱) تحت هیچ شرایطی ب فرد هیچگونه خوراکی و نوشیدنی ندهید
- (۲) فرد را گرم و خشک نگه داشته، اقدامات مربوط ب درمان شوک را انجام دهید
- (۳) در صورت امکان عضو آسیب دیده را پایین تراز سطح قلب قرار دهید ✓
- (۴) در محل آسیب دیده هیچ گونه فشاری اعمال نشود

-کدام مورد درباره علائم واضح شوک در افراد بیهوش صحیح می باشد؟

- (۱) پوست رنگ پریده
- (۲) پوست سرد، مرطوب و چسبناک
- (۳) افزایش ضربان نبض
- (۴) همه موارد ✓

-در مورد دلایل تنگی نفس کدام گزینه درست می باشد؟

- (۱) فرورفتن در عمق آب و حبس نفس ب مدت طولانی همراه با فعالیت ✓
- (۲) وراثت و سابقه خانوادگی
- (۳) عوامل نامعلوم و نامشخص
- (۴) تغییرات محیطی، منطقه ایی

-به وضعیتی اطلاق میشود ک عضله قلب ب طور ناگهانی از تلمبه طبیعی خون باز می ایستد

- (۱) ایست ناگهانی قلب ✓
- (۲) ایست قلبی
- (۳) حمله قلبی
- (۴) آنژین قلبی

-کدام مورد از علائم و نشانه های بیماری صرع نمی باشد؟

- (۱) فشردن دندان ها بر روی یکدیگر
- (۲) گاز گرفتن لب ها و زبان و تنش و پرش غیر ارادی در عضلات
- (۳) افزایش بزاق دهان
- (۴) بیهوشی کامل ✓